


Knolraap

Net als rucola, kolen, radijzen, mosterd, ..., is de knolraap, Brassica rapa var. rapifera, een kruisbloemachtige, zo genoemd naar de vier kroonblaadjes die in een kruis opgesteld staan. Hij wordt ook nog meiraap of meiknolletje genoemd.

Over de oorsprong van de knolraap is men niet zeker, maar de plant zou een gemeenschappelijke voorouder hebben met de Aziatische kolen, waarmee hij nog steeds kan kruisen. De knolraap werd al geteeld door de Romeinen, waar hij door alle sociale klassen werd gegeten. Hij werd verspreid over heel Europa. Hij neemt voldoening met een arme grond, en vormde daarom lang een hoofdbestanddeel van onze voeding. Vanaf de 16e eeuw werd hij geleidelijk aan onttroond door de aardappel.



HOE TELEN ?

Specifieke noden, kenmerken :

De knolraap is een wortelgroente die gemakkelijk teelt. Hij houdt van lichte gronden en koele temperaturen. Ontkiemen doet hij al vanaf 7°C, maar bij iets hogere temperaturen gaat het ontkiemen sneller. Knolraap kan niet tegen droogte, en tijdens de zomer is waternood zeer vaak nefast. De beste momenten om knolraap te verbouwen zijn in de lente en de herfst. Associatie met erwten en sla is voordelig, net als tomaten, venkel en absintalsem.

Ziekten en plagen:

In vochtige perioden is de plant onderhevig aan slakkenaanvallen, waar in droge perioden de aardvlo, een kleine springende kever, de kiem kan doorboren, of later de bladeren, wat de groei enorm belemmert. De koolvlieg legt zijn eieren aan de kroon van de raap, en zijn larven bijten zich gangen door de wortels.

TIP:

Om de knolraap te beschermen tegen aardvlo en koolvlieg, kan men ze bedekken met een anti-insectenzeil. Tomaat, absintalsem en venkel verjagen ook de aardvlo, en kunnen dus best in de buurt of tussen de rapen geplant worden.



Keuze van de variëteiten

Er bestaan verscheidene variëteiten, die verschillen in vorm, kleur, smaak, resistentie tegen droogte, teeltduur, ...

We kunnen een onderscheid maken in functie van de zaaiperiode ::

- **Lenterassen** : *van Milaan* (bolvormige witte knol, met een felrose top), *Demi long de Croissy* (witte, cilindervormige, taps toelopende knol);
- **Zomerrassen** : *De Nancy à collet rouge* (ronde, witte knol met paarse top), *Des Vertus Marteau* (witte knol, dikker onderaan);
- **Herfstrassen** : *Goudbal* (gele, bolvormige knol, goed bewaarbaar), *Des Vertus Marteau* (witte wortel, bolle vorm aan de onderkant);
- **Rassen voor alle seizoenen** : *Petrowsky* (onde, gele knol met witte kern, zeer vroeg)

Teelttechnieken

Zaaien :

De zaaiperiode varieert al naargelang het ras. Zaai de zaadjes in volle aarde, 2 cm diep en met een rijafstand van 20 cm. Na 4 tot 7 dagen ontkiemen ze al.

Lenterassen kunnen gezaaid worden van maart tot eind april, zomerrassen van mei tot midden juli en herfstrassen van midden juli tot eind augustus.

Opvolging teelt:

Dun uit tot 4 à 5 cm van zodra de plantjes twee of drie echte bladeren hebben, buiten de twee zaadlobben. Hou de grond koel en vochtig en mulch in de zomer.

Wied tussen de rijen om overwoekering van onkruid te vermijden.

Oogst:

De oogst begint ongeveer twee maand na het zaaien. Oogst in de lente, zomer en herfst naar behoefte, van zodra ze groot genoeg zijn, zonder ze echter te groot te laten worden.

Er zijn herfstrassen die goed bewaren in volle grond (Goudbal). Om geen knaagdieren aan te trekken is het echter beter alles te oogsten en te bewaren in de kelder. Zorg er wel voor dat de bladeren op 1 of 2 cm afgeknipt zijn, net als het onderste van de wortel.

